

Amistrobin

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Fungicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Azoxystrobin..... 500 g/Kg
GRUPO QUIMICO	Estrobilurina
FORMULACIÓN	Gránulos dispersables(WG)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 622 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	AMISTROBIN es un fungicida sistémico y translaminar del grupo de las estrobilurinas. Posee propiedades protectantes, curativas y erradicantes. Inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento del micelio, también muestra actividad antiesporulante.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.* (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200L	kg/ha		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.06	-	0	5
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.08	0.2	7	0.01
Fresa	Podredumbre gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.1		0	10
Palto	Podredumbre gris/Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.04-0.055	0.15 – 0.2	n/d.	0.05
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.08	-	7	7
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.05	0.2	14	2
	Podredumbre gris/Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.04-0.06	0.142-0.225	14	2

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

* Última aplicación antes de la cosecha **n/d.:** No determinado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Agregar lentamente los gránulos en el tanque y mantenerlo en agitación mientras se está aplicando. No pre-mezclar el producto.</p> <p>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte no rocío en la superficie de la planta.</p> <p>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</p> <p>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</p> <p>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</p>
--------------------------------------	--

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	Realizar un máximo de dos aplicaciones por campaña/año. El intervalo entre aplicaciones de AMISTROBIN es de 20 días. Aplicar cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad. Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo; el nivel de daño dependerá de la interacción enfermedad-cultivo. Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.
PERIODO DE REINGRESO	No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas, después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD	Compatible con la mayoría de plaguicidas, excepto con productos de reacción alcalina. Evitar agentes oxidantes. En caso de duda se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad a la dosis recomendada.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico si es usado a la dosis y uso recomendados.
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911 (línea gratuita)