

FENTOX

INSECTICIDA AGRÍCOLA

| | |
|-----------------------------------|--|
| CLASE | Insecticida Agrícola |
| INGREDIENTE ACTIVO | Emamectin benzoate..... 50 g/L |
| GRUPO QUÍMICO | Avermectin |
| FORMULACIÓN | Gránulos Solubles (SG) |
| DISTRIBUIDOR | Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO |
| Nº REGISTRO | PQUA N° 1749 – SENASA |
| TITULAR DE REGISTRO | SOCIEDAD AMÓNIMA FAUSTO PIAGGIO |
| TOXICIDAD | Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso.Cuidado |
| MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN | FENTOX es un insecticida de acción translaminar. Actúa principalmente por ingestión y contacto directo sobre lepidópteros. Actúa sobre el sistema nervioso de los insectos, su modo de acción es a nivel de activadores del canal de cloro. |

CUADRO DE USOS

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | P.C. (días) | LMR (ppm) |
|----------|-------------------|------------------------------|-------|----------------|--------------|
| | Nombre común | Nombre científico | kg/ha | | |
| Arroz | Gusano Cogollero | <i>Spodoptera frugiperda</i> | 0.1 | 7 | 0.01 |
| Pimiento | Gusano perforador | <i>Heliothis virescens</i> | 0.2 | 3 | 0.2 |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

| | |
|---|---|
| INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO | <p>Preparación y aplicación:</p> <p>Agregue FENTOX según el cuadro de dosis y usos. Disolver previamente FENTOX en un balde con agua, mezclar, hasta que no quede ningún grumo y la mezcla sea homogénea, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo. |
| FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN | <p>Aplicar al observar la presencia de la plaga o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para su desarrollo. Aplicar una vez por campaña y por año como máximo.</p> |
| PERIODO DE REINGRESO | <p>No ingrese a las áreas tratadas durante 12 horas posteriores a la aplicación.</p> |

| | |
|--|---|
| COMPATIBILIDAD | FENTOX es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina. |
| FITOTOXICIDAD | FENTOX no es fitotóxico si se aplica a las dosis recomendadas. |
| MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS | Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin. |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 |