

FIPROMAX

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Insecticida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Fipronil.....200 g/L
GRUPO QUÍMICO	Phenylpyrazole
FORMULACIÓN	Suspensión concentrada (SC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
N° REGISTRO	PQUA N° 887 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Amarillo Moderadamente peligroso. Dañino
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	FIPROMAX es un insecticida que pertenece al grupo de los fenilpirazoles de acción sistémica y de amplio espectro; actúa por contacto e ingestión, actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, lo cual se traduce en convulsiones que se asocian con anormales descargas eléctricas masivas en su sistema nervioso, provocándole la muerte.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Arroz	Mosca minadora del arroz	<i>Hydrellia wirthi</i>	0.2 – 0.25	-	46	0.01
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.2	0.45 - 0.66	28	0.005
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes suturicallus</i>	0.2	-	14	0.005
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.15 – 0.2	-	N.D.	0.005

P.C.: Período de carencia (días) **LMR:** Límite máximo de residuos
N.D.: No Determinado

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>FIPROMAX es fácil de preparar, verter la dosis recomendada en agua y obtener una solución uniforme, luego se completa con agua hasta alcanzar el volumen de aplicación.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Se deberá evaluar la incidencia de la plaga para proceder a la aplicación. También dependerá de la etapa del desarrollo del cultivo y la época de siembra. En el cultivo de espárrago se recomienda aplicar cuando el nivel de infestación de los brotes este en 5%.</p> <p>Se recomienda realizar 1 aplicación por campaña. Realizar las aplicaciones a horas tempranas de la mañana y/o por las tardes, evitar aplicaciones con viento, los cuales pueden arrastrar el producto a cultivos aledaños.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No entre a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD	FIPROMAX es compatible con la mayoría de plaguicidas. Se aconseja que antes de mezclarlo con otros productos se realice una prueba de compatibilidad.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>