

FURTE

INSECTICIDA – NEMATICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Otros: Insecticida – nematicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Carbofuran..... 480g/L
GRUPO QUÍMICO	Carbamato
FORMULACIÓN	Suspensión Concentrada (SC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	Reg. PQUA Nº 477 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sharda Peru SAC
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Rojo Altamente peligroso. Tóxico
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	FURTE es un insecticida – nematicida a base de Carbofuran que, aplicado al follaje, actúa por contacto e ingestión y con gran efecto residual. Cuando es aplicado al suelo actúa como insecticida y nematicida sistémico al ser absorbido por las raíces.


CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		P.C. días	L.M.R. ppm
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Algodón	Pulgón de la maleza	<i>Aphis gossypii</i>	0.075 – 0.1	0.3 – 0.4	-	-
Marigold	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.4 – 0.6	0.8 – 1.5	45 -80	1
Papa	Gorgojo de los andes Pulga saltona	<i>Premnotrypes latithorax</i> <i>Epitrix parvula</i>	0.4 – 0.6	0.8 – 1.5	30	1
Vid	Filoxera	<i>Daktulosphaeria vitifoliae</i>	2.6 – 3.0	7.8 – 9.0	14	0.3
	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	2.3 – 2.6	6.9 – 7.8	14	0.3
Caña de azúcar	Nemátodo del nudo	<i>Meloidogyne incognita</i>	0.1 - 0.15	2.0 - 3.0	90	0.01

P.C.: Período de carencia (días)

LMR: Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>No usar el producto en suelos arenosos ni en zonas con napa freática superficial.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Iniciar la aplicación de FURTE a la presencia de la plaga, puede ser aplicación dirigida al pie de la planta o al follaje.</p> <p>No aplicar en época de floración.</p> <p>Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por campaña, con un intervalo mínimo de 20 días.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No entre a las zonas tratadas hasta después de 48 horas de realizada la aplicación.
COMPATIBILIDAD	FURTE es compatible con plaguicidas de uso común excepto con los de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD	FURTE no presenta riesgo de fitotoxicidad si se aplica en los momentos y dosis recomendados.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <div style="text-align: right;">  </div>
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>