

GALÁCTICO

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Insecticida Agrícola
INGREDIENTES ACTIVOS	Fipronil.....400 g/Kg Imidacloprid.....400 g/Kg
GRUPO QUÍMICO	Phenylpyrazole + Neonicotinoide
FORMULACIÓN	Gránulos Dispersables (WG)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA N° 2148 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Amarillo Moderadamente peligroso. Dañino
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	GALACTICO es un insecticida sistémico, de ingestión y contacto. Afecta el sistema nervioso de los insectos bloqueando la cadena GABA regulador del cloro, generando parálisis y muerte.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	g/ha		
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	200	400	14* 21**	0.02* 0.1**

P.C.: Período de carencia
*Fipronil **Imidacloprid

L.M.R.: Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Se realizan en campo abierto requiriendo para ello la utilización de equipos de protección. Siempre se debe mezclar la dosis recomendada en la etiqueta sobre agua limpia (el volumen de agua depende de cada cultivo y el momento fenológico del cultivo).</p> <p>Evitar la aplicación cuando se tenga presencia de vientos fuertes.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Realizar máximo 1 aplicación por campaña, y es 1 campaña por año.</p> <p>Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de la plaga, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación, considerando que un porcentaje de brotes dañados mayor al 6% será un momento oportuno para la aplicación del producto. No aplicar en época de floración.</p>

PERIODO DE REINGRESO	No reingrese al campo, sin ropa protectora, antes de transcurridas 24 horas de realizada la aplicación, siguiendo las dosis y recomendaciones que figuran en esta etiqueta.
COMPATIBILIDAD	Es compatible con los insecticidas, fungicidas y acaricidas de uso común. No mezclar con los de reacción alcalina.
FITOTOXICIDAD	GALACTICO no es fitotóxico a la dosis y uso recomendados.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en lugares destinados por las autoridades locales para este fin.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 CICOTOX 0800-13-040