

# LARVURON

## 50 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

<b>CLASE</b>	Insecticida Agrícola
<b>INGREDIENTE ACTIVO</b>	Lufenuron..... 50 g/L
<b>GRUPO QUÍMICO</b>	Benzoylurea
<b>FORMULACIÓN</b>	Concentrado Emulsionable (EC)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>Nº REGISTRO</b>	PQUA N° 959 – SENASA
<b>TITULAR DE REGISTRO</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Azul</b> Ligeramente peligroso. Cuidado
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<b>LARVURON 50 EC</b> es un insecticida inhibidor del crecimiento que interfiere en la síntesis de quitina. <b>LARVURON 50 EC</b> es un insecticida larvicida sistémico que actúa por contacto e ingestión. También tiene efecto transovárica, las hembras que ingieren el producto lo transfieren a los huevos por tanto los embriones no eclosionan.

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L/200L	L/ha		
Espárrago	Gusano de tierra	<i>Copitarsia decolora</i>	0.15 - 0.27	0.375-0.5	7	0.02
Maíz	Gusano cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.2	0.5	10	0.02
Pimiento	Gusano perforador grande de la bellota	<i>Heliothis virescens</i>	-	0.6-0.7	7	1.0
Tomate	Caballada	<i>Spodoptera eridania</i>	0.15- 0.2	-	7	0.5

**P.C.:** Período de carencia

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p>Aplicar en aspersión foliar.</p> <p>Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación con agua hasta la mitad, agregue la dosis recomendada, agite y complete el tanque con agua.</p> <p>Evitar la aplicación cuando se tenga presencia de vientos fuertes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</li> <li>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</li> <li>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</li> <li>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</li> </ul>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	<p>Iniciar el tratamiento, previa evaluación del cultivo, cuando el nivel de daño económico lo justifique. Aplicar <b>LARVURON 50 EC</b> (i.a. Lufenuron) hasta 02 aplicaciones por campaña/cultivo como máximo, siendo dos campañas por año.</p>

<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.
<b>COMPATIBILIDAD</b>	<b>LARVURON 50 EC</b> es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso frecuente, a excepción de aquellos de reacción alcalina y agentes oxidantes.
<b>FITOTOXICIDAD</b>	<b>LARVURON 50 EC</b> no es fitotóxico para los cultivos recomendados en esta etiqueta.
<b>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)          CISPROQUIM: 0800-50847          SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>