

# RANCHERO

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

<b>CLASE</b>	Fungicida Agrícola
<b>INGREDIENTES ACTIVOS</b>	Mancozeb.....640 g/Kg Metalaxyl.....80 g/Kg
<b>GRUPO QUIMICO</b>	Carbamato y Phenylamide
<b>FORMULACIÓN</b>	Polvo Mojable (WP)
<b>DISTRIBUIDOR</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>Nº REGISTRO</b>	PQUA Nº 2257 – SENASA
<b>TITULAR DE REGISTRO</b>	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
<b>TOXICIDAD</b>	Etiqueta con franja de color <b>Azul</b> Ligeramente peligroso. Cuidado
<b>MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN</b>	<p><b>RANCHERO</b> es un fungicida sistémico de amplio espectro, con actividad protectora y curativa, se recomienda la aplicación tempranamente para evitar la acumulación de la enfermedad.</p> <p><b>RANCHERO</b> es una mezcla de dos fungicidas de diferentes modos de acción:</p> <p>Metalaxyl es del grupo de las fenilamidas, se absorben rápidamente en el tejido de la planta y son trasladadas acropetalmente dentro de la planta.</p> <p>Mancozeb pertenece al grupo de los ditiocarbamatos y actúa por contacto sobre los hongos fitopatógenos.</p>

### CUADRO DE USOS


CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/ha	Kg/cil 200 L		
Tomate	Hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	2	-	15	0.2* 3**

**P.C.:** Período de carencia

**LMR:** Límite máximo de residuos

\*Metalaxyl \*\*Mancozeb

<b>INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO</b>	<p>Se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una pre-mezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto este bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</li> <li>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</li> <li>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</li> <li>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</li> </ul>
<b>FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicar al observar los primeros síntomas o cuando las condiciones medioambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.</li> <li>- Repetir la aplicación en caso de reinfección. Se recomienda 1 a 2 aplicaciones por campaña.</li> <li>- Usar la dosis más alta a mayor presión de la enfermedad.</li> <li>- Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.</li> <li>- En caso se requiera una nueva aplicación, usar otro fungicida de diferente mecanismo de acción, a fin de evitar la resistencia.</li> </ul>

<b>PERIODO DE REINGRESO</b>	No ingrese a las áreas tratadas durante 24 horas posteriores a la aplicación.
<b>COMPATIBILIDAD</b>	Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas e insumos comunes usados en los diferentes cultivos, excepto con los de reacción alcalina.
<b>FITOTOXICIDAD</b>	No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.
<b>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS</b>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
<b>TELÉFONOS DE EMERGENCIA</b>	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4)          CISPROQUIM: 0800-50847          SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p>