

SUPRA ONE 400 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

| | |
|-----------------------------------|--|
| CLASE | Fungicida Agrícola |
| INGREDIENTE ACTIVO | Isoprothiolane..... 400 g/L |
| GRUPO QUIMICO | Phosphorothiolate |
| FORMULACIÓN | Concentrado Emulsionable (EC) |
| DISTRIBUIDOR | Sociedad Anónima Fausto Piaggio |
| Nº REGISTRO | PQUA Nº 957 – SENASA |
| TITULAR DE REGISTRO | Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO |
| TOXICIDAD | Etiqueta con franja de color Amarillo Moderadamente peligroso. Dañino |
| MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN | SUPRA ONE 400 EC es un fungicida sistémico de amplio espectro con acción preventiva y curativa. Se absorbe por las hojas y raíces, y presenta translocación acropétalo y basipétalo. SUPRA ONE 400 EC inhibe el proceso de penetración del hongo (efecto preventivo) y detiene el crecimiento de las hifas infectivas que forman el micelio y la germinación de las conidias (efecto curativo). |


CUADRO DE USOS

| CULTIVO | PLAGA | | DOSIS | | P.C. (días) | L.M.R. (ppm) |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------|------|----------------|-----------------|
| | Nombre común | Nombre científico | L/200L | L/ha | | |
| Arroz | Pyricularia | <i>Pyricularia oryzae</i> | 0.5 | 0.5 | 28 | 0.5 |
| Espárrago | Cercosporiasis o mancha foliar | <i>Cercospora asparagi</i> | 0.5 | 1.0 | 14 | 0.01 |

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

| | |
|---|---|
| INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO | <p>Aplicar en pulverizaciones previamente mezclado con agua, para ello agitar el producto, llenar el tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, añada el producto según dosis de etiqueta, agitar y añadir el resto de agua, continuar agitando hasta formar una mezcla homogénea.</p> <p>-Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta.</p> <p>-Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.</p> <p>-Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.</p> <p>-Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</p> |
| FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN | <p>Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad (preventivo) o tan pronto como se observen los primeros síntomas (curativo).</p> <p>Repetir la aplicación en intervalos de 7 a 14 días. Realizar como máximo 2aplicaciones por campaña.</p> |
| PERIODO DE REINGRESO | <p>24 horas después de la aplicación.</p> |
| COMPATIBILIDAD | <p>SUPRA ONE 400 EC es compatible con la mayoría de los agroquímicos de uso convencional, excepto con los de reacción fuertemente alcalina, ácida u oxidante.</p> |

| | |
|--|--|
| FITOTOXICIDAD | <p>SUPRA ONE 400 EC no es fitotóxico si se usa a la dosis recomendada.</p> |
| MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS | <p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <div style="text-align: right;">  </div> |
| TELÉFONOS DE EMERGENCIA | <p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222</p> |