

TEBOCUR

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Fungicida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Tebuconazole..... 250 g/L
GRUPO QUIMICO	Triazoles
FORMULACIÓN	Emulsión aceite en Agua (EW)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
N° REGISTRO	PQUA N° 436 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Azul Ligeramente peligroso. Cuidado
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	TEBOCUR es un fungicida sistémico del grupo de los Triazoles, de amplio espectro con acción protectora, curativa y erradicante. Este fungicida es rápidamente absorbido por las partes vegetativas de la planta y traslocado en sentido acropétalo hacia los meristemos terminales en los que se acumula ligeramente.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L /200L	L/ha		
Arroz	Pyricularia	<i>Pyricularia oryzae</i>	0.2	-	35	1.5
Cebolla	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	0.2	-	7	0.1
Esparrago	Mancha foliar	<i>Cercospora asparagi</i>	0.2	-	7	0.02
Papa	Tizón temprano	<i>Alternaria solani</i>	0.2	-	30	0.05
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.2	-	7	0.6
Vid	Oidium	<i>Erysiphe necator</i>	0.15	-	21	2

P.C.: Período de carencia

L.M.R.: Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Aplicar en pulverizaciones previamente mezclado con agua, para ello agitar el producto, llenar el tanque de aplicación con agua limpia hasta la mitad, añade el producto según la dosis de la etiqueta, agitar y añadir el resto de agua, continuar agitando hasta formar una mezcla homogénea.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
--------------------------------------	--

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	Aplicar previa evaluación del campo de cultivo y según nivel de daño económico. Realizar un máximo de una aplicación por campaña/año.
PERIODO DE REINGRESO	No entre alas áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD	Se puede aplicar en mezcla con otros plaguicidas, pero al realizar la mezcla es recomendable efectuar una confirmación previa de compatibilidad.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911 (línea gratuita)</p>