

VORTEX

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Insecticida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Chlorpyrifos.....480g/L
GRUPO QUÍMICO	Organofosforado
FORMULACIÓN	Concentrado Emulsionable (EC)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
N° REGISTRO	PQUA N° 1934-SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Amarillo Moderadamente peligroso. Dañino
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	VORTEX es un insecticida de acción inmediata y prolongada. VORTEX es un producto sumamente efectivo para el control de insectos barrenadores, perforadores y masticadores. Su acción es por contacto, inhalación e ingestión.

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGA		DOSIS	L.M.R. Ppm	P.C. días
	Nombre común	Nombre científico	L/200L		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.6	0.05	21
	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.3	0.05	21
	Gusano de tierra	<i>Copitarsia decolora</i>	0.5	0.05	21
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.35 - 0.40	0.05	7
Frijol	Barrenador de brotes	<i>Crociosema aporema</i>	0.4	0.05	21
Sorgo	Gusano perforador del ápice	<i>Pococera atramentalis</i>	0.4	0.5	21
Mandarino	Queresa coma	<i>Lepidosaphes beckii</i>	0.3	1	21
Vid	Piojo harinoso	<i>Pseudococcus viburni</i>	0.375	0.5	14
Palto	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.4	0.05	14

P.C. Periodo de carencia

L.M.R. Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Agregue VORTEX al agua según el cuadro de dosificación. Agítese el envase antes de usar. Es recomendable preparar una pre-mezcla diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.</p> <p>La dosis está relacionada con la edad de la planta y el grado de infestación.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.
--------------------------------------	---

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	La frecuencia se hará según la reinfestación y la época de aplicación cuando observe la plaga.
PERIODO DE REINGRESO	No entre alas áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.
COMPATIBILIDAD	Es compatible con la mayoría de insecticidas y fungicidas a excepción de productos alcalinos.
FITOTOXICIDAD	No es fitotóxico usado a la dosis y en el cultivo recomendado.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta lasolución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándoloy deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> 
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	<p>ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911 (línea gratuita)</p>