

ACETAPRID 200 SP

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CLASE	Insecticida Agrícola
INGREDIENTE ACTIVO	Acetamiprid..... 200 g/Kg
GRUPO QUÍMICO	Neonicotinoide
FORMULACIÓN	Polvo soluble (SP)
DISTRIBUIDOR	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
Nº REGISTRO	PQUA Nº 799 – SENASA
TITULAR DE REGISTRO	Sociedad Anónima FAUSTO PIAGGIO
TOXICIDAD	Etiqueta con franja de color Amarillo Moderadamente peligroso. Dañino
MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN	ACETAPRID 200 SP es un insecticida sistémico de amplio espectro con actividad translaminar que actúa por contacto e ingestión. ACETAPRID 200 SP es eficaz para el control de mosca blanca, queresa y thrips en diversos cultivos como pimiento, palto y cebolla respectivamente. ACETAPRID 200 SP tiene efecto sobre los huevos, ninfas y adultos de insectos.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/200L	Kg/ha		
Arroz	Cigarrita del virus de la hoja blanca	<i>Tagosodes orizicolus</i>	0.1	-	7	0.01
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	0.15-0.2	0.45-0.6	7	0.02
Palto	Queresa	<i>Fiorinia fioriniae</i>	0.1	0.5	21	0.01
Pimiento	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.1	0.3	7	0.3
Arándano	Mosca blanca	<i>Bemisia tabaci</i>	0.08	-	1	2

P.C.: Período de carencia **L.M.R.:** Límite máximo de residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO	<p>Aplicar en aspersión foliar. Para preparar la mezcla, llene el tanque de preparación con agua hasta la mitad, agregue la dosis recomendada, agite y complete el tanque con agua. Evitar la aplicación cuando se tenga presencia de vientos fuertes. -Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde, sin viento fuerte ni rocío en la superficie de la planta. -Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto. -Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados. -Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.</p>
--------------------------------------	---

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - El momento de aplicación es cuando las condiciones ambientales sean propicias para el desarrollo de la plaga. - Toda aplicación debe ser posterior a una evaluación rigurosa del cultivo, el nivel de daño dependerá de la interacción plaga-cultivo. - Se recomienda hasta un máximo de 3 aplicaciones por Campaña/año. - Rotar con plaguicidas de diferente grupo químico entre aplicaciones.
PERIODO DE REINGRESO	Puede reingresar sin equipo de protección 24 horas después de aplicado el producto.
COMPATIBILIDAD	ACETAPRID 200 SP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aquellas de reacción fuertemente alcalina u oxidante.
FITOTOXICIDAD	ACETAPRID 200 SP no es fitotóxico cuando es utilizado según se recomienda.
MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS	Después de usar el contenido destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridad es locales para este fin.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	ESSALUD EN LÍNEA: 411-8000 (opción 4) CISPROQUIM: 0800-50847 SOCIEDAD ANONIMA FAUSTO PIAGGIO: 464-2222 CETOX: 080071911 (línea gratuita)