

STOPPER+

TIPO	PROMOTOR DE AUTODEFENSAS
INGREDIENTE ACTIVO	Compuesto Fosforado Complejo Cúprico
FORMULACIÓN	Concentrado Soluble
FORMULADOR	Sociedad Anónima Fausto Piaggio
CARACTERISTICAS	<p>STOPPER + es un nutriente foliar líquido, con alta concentración de Fósforo 100% bioasimilable por la planta. La cual favorece la formación de raíces, así como elemento principal parte los cultivos.</p> <p>STOPPER + es un generador de autodefensas de las plantas (Fitoalexinas) gracias a la estimulación del ácido fosfórico.</p> <p>STOPPER + es ideal para el manejo integrado de enfermedades foliares.</p>
PROPIEDADES FISICO QUIMICAS	<p>Aspecto: Líquido translúcido Color: Celeste verdoso Olor: Característico pH: 0.6 – 1.2 Solubilidad: Soluble en agua Densidad: 1.43 – 1.45 g/ml</p>

CULTIVO	MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón	1º: Después del desahije 2º: Repetir cada 15 días (02 aplicaciones)
Papa	Durante todo el desarrollo vegetativo
Arroz	1º: En almácigo antes del trasplante 2º: Repetir cada 15 días durante el macollamiento.
Vid	1º: Al inicio de la floración 2º: Al cuajado de fruto.
Banano	1º: Crecimiento del hijuelo 2º: Pre floración.
Espárrago	1º: Después del brotamiento 2º: Repetir cada 15 días.
Paprika, ají panca, pimiento, tomate, rocoto, piquillo, berenjena, fresa, tomate, pepinillo	1º: Aplicación en el almácigo. 2º: 5 días después del trasplante 3º: Repetir cada 15 días.
Brócoli, col, coliflor	Aplicar cada 15 días durante el crecimiento vegetativo
Leguminosas arveja, frijol, habas, vainita, holantao, pallar, garbanzo	1º: Aplicar a los 15 días después de la siembra 2º: Repetir cada 15 días durante todo el periodo vegetativo.
Zapallo, sandía, melón, pepinillo	1º: Aplicar a los 15 días después de la siembra 2º: Repetir cada 15 días durante todo el periodo vegetativo.
Cebolla, ajos	Aplicar después del trasplante cada 15 días.
Poró, beterraga, zanahoria, rabanito, apio	Aplicar después del trasplante cada 15 días.
Arándano, manzano, higo, cereza, melocotón, peral, ciruelo	1º: Aplicar al inicio de la floración 2º: Repetir cada 20 días (02 aplicaciones)
Cacao, café, palto, cítricos, lúcuma, mango, dátil, granada, granadilla, maracuyá, aguaymanto	1º: Aplicar al inicio de floración luego cada 20 días dos aplicaciones. 2º: Repetir cada 20 días (02 aplicaciones) Para pudrición radicular realizar aplicaciones a cuello de planta.

DOSIS

ALMACIGOS	25 - 30 cc	por mochila de 20L
FOLIAR	500 - 750 cc	por cilindro de 200L / agua
FERTIRRIEGO	2 - 3 L	/ha

<p>PREPARACION Y APLICACION</p>	<p>STOPPER + se prepara diluyendo la dosis indicada en el cuadro de usos, en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.</p>
<p>COMPATIBILIDAD</p>	<p>STOPPER + es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales.</p>
<p>PRECAUCIONES EN EL MANEJO</p>	<p>Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. Usar la mezcla inmediatamente después de preparada. No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón.</p> <p>En caso de emergencia llamar al teléfono: Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita)</p>
<p>MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS</p>	<p>Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.</p> <p>Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.</p> 